

# Алгебра и теория чисел

Гаевой, Казменко, Макаров

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Понедельник, 19 октября 2020 года

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{n}$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любой модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 Линейные рекуррентности
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{q}$   $l$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любой модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 Линейные рекуррентности
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

# Наибольший общий делитель

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример:  $\gcd(4, 6) = 2$

# Наибольший общий делитель

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример:  $\gcd(4, 6) = 2$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$

# Наибольший общий делитель

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример:  $\gcd(4, 6) = 2$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a \bmod b, b)$

# Наибольший общий делитель

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример:  $\gcd(4, 6) = 2$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a \bmod b, b)$
- $\gcd(a, 0) = a$

# Наименьшее общее кратное

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наименьшее общее кратное.

- Пример:  $\text{lcm}(4, 6) = 12$

# Наименьшее общее кратное

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наименьшее общее кратное.

- Пример:  $\text{lcm}(4, 6) = 12$
- $\text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b$

# Наименьшее общее кратное

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ .

Найдите их наименьшее общее кратное.

- Пример:  $\text{lcm}(4, 6) = 12$
- $\text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b$

- Доказательство:

Рассмотрим степень каждого простого числа.

$$a : p^\alpha$$

$$b : p^\beta$$

$$\text{gcd}(a, b) : p^{\min(\alpha, \beta)}$$

$$\text{lcm}(a, b) : p^{\max(\alpha, \beta)}$$

$$\alpha + \beta = \min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta)$$

## Код

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int gcd (int a, int b) {
6      if (a == 0) return b;
7      return gcd (b % a, a);
8  }
9
10 int main () {
11     int a, b;
12     cin >> a >> b;
13     cout << gcd (a, b) << endl;
14     return 0;
15 }
```

ВВОД:

500000

200000

ВЫВОД:

100000

## Код

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int gcd (int a, int b) {
6      if (a == 0) return b;
7      return gcd (b % a, a);
8  }
9
10 int lcm (int a, int b) {
11     return a / gcd (a, b) * b;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b;
16     cin >> a >> b;
17     cout << lcm (a, b) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:

500000

200000

ВЫВОД:

1000000

## Код

```
1  #include <cassert>
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int gcdExt (int a, int b, int & x, int & y) {
6      if (a == 0) {x = 0; y = 1; return b;}
7      auto res = gcdExt (b % a, a, y, x);
8      x -= (b / a) * y;
9      assert (x * a + y * b == res);
10
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, x, y;
16     cin >> a >> b;
17     cout << gcdExt (a, b, x, y) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:  
12 5  
ВЫВОД:  
1

## Код

```

1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int gcdExt (int a, int b, int & x, int & y) {
6      if (a == 0) {x = 0; y = 1; return b;}
7      auto res = gcdExt (b % a, a, y, x);
8      x -= (b / a) * y;
9      cout << x << " * " << a << " + " <<
10         y << " * " << b << " = " << res << endl;
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, x, y;
16     cin >> a >> b;
17     cout << gcdExt (a, b, x, y) << endl;
18     return 0;
19 }

```

ВВОД:

12 5

ВЫВОД:

$$1 * 1 + 0 * 2 = 1$$

$$-2 * 2 + 1 * 5 = 1$$

$$5 * 5 + -2 * 12 = 1$$

$$-2 * 12 + 5 * 5 = 1$$

1

# Линейное представление НОД

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ . Пусть  $d = \gcd(a, b)$ .

Найдите такие целые числа  $x$  и  $y$ , что  $xa + yb = d$ .

- Пример:  $a = 12$ ,  $b = 5$ :  $(-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$

# Линейное представление НОД

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ . Пусть  $d = \gcd(a, b)$ .

Найдите такие целые числа  $x$  и  $y$ , что  $xa + yb = d$ .

- Пример:  $a = 12$ ,  $b = 5$ :  $(-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$

# Линейное представление НОД

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ . Пусть  $d = \gcd(a, b)$ .

Найдите такие целые числа  $x$  и  $y$ , что  $xa + yb = d$ .

- Пример:  $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$

# Линейное представление НОД

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ . Пусть  $d = \gcd(a, b)$ .

Найдите такие целые числа  $x$  и  $y$ , что  $xa + yb = d$ .

- Пример:  $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a + b \operatorname{div} a \cdot a) + x \cdot a = d$

# Линейное представление НОД

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ . Пусть  $d = \gcd(a, b)$ .

Найдите такие целые числа  $x$  и  $y$ , что  $xa + yb = d$ .

- Пример:  $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a + b \operatorname{div} a \cdot a) + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a) + (x + b \operatorname{div} a \cdot y) \cdot a = d$

# Линейное представление НОД

## Задача:

Даны целые числа  $a$  и  $b$ . Пусть  $d = \gcd(a, b)$ .

Найдите такие целые числа  $x$  и  $y$ , что  $xa + yb = d$ .

- Пример:  $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a + b \operatorname{div} a \cdot a) + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a) + (x + b \operatorname{div} a \cdot y) \cdot a = d$
- $y = y', x = x' - b \operatorname{div} a \cdot y$

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{p}$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любого модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 Линейные рекуррентности
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

## Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю  $m$ .

## Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю  $m$ .

- **Лемма 1:**  $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$ .

# Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю  $m$ .

- **Лемма 1:**  $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$ .
- **Лемма 2:**  $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$ .

## Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю  $m$ .

- **Лемма 1:**  $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$ .
- **Лемма 2:**  $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$ .
- Для деления такое равенство неверно.

# Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю  $m$ .

- **Лемма 1:**  $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$ .
- **Лемма 2:**  $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$ .
- Для деления такое равенство неверно.
- Python:  $(-37) \bmod 10 = 3$   
Другие языки:  $(-37) \bmod 10 = -7$

# Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю  $m$ .

- **Лемма 1:**  $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$ .
- **Лемма 2:**  $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$ .
- Для деления такое равенство неверно.
- Python:  $(-37) \bmod 10 = 3$   
Другие языки:  $(-37) \bmod 10 = -7$
- Почему: `div` и `mod` вычисляются одновременно, и при этом `div` округляет к нулю.

# «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если числа порядка  $m^2$  помещаются в тип данных, можно просто применить Лемму 1:

$$(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m.$$

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $2a \bmod m$ ,  $4a \bmod m$ ,  $8a \bmod m$ ,  $\dots$
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 10$ ,  $m = 21$ .

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $2a \bmod m$ ,  $4a \bmod m$ ,  $8a \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 10$ ,  $m = 21$ .

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $2a \bmod m$ ,  $4a \bmod m$ ,  $8a \bmod m$ ,  $\dots$
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 10$ ,  $m = 21$ .

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $2a \bmod m$ ,  $4a \bmod m$ ,  $8a \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 10$ ,  $m = 21$ .

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 10$ ,  $m = 21$ .

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

**Ответ:**  $((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m) \bmod m =$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

- **Проверка:**

$$(13 \cdot 10) \bmod 21 = 130 \bmod 21 = (126 + 4) \bmod 21 = 4.$$

- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до  $2 \cdot m - 2$ .

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 10$ ,  $m = 21$ .

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

**Ответ:**  $((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m) \bmod m =$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

- **Проверка:**

$$(13 \cdot 10) \bmod 21 = 130 \bmod 21 = (126 + 4) \bmod 21 = 4.$$

- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до  $2 \cdot m - 2$ .

## «Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление  $(a \cdot b) \bmod m$ .

Если же число  $m^2$  слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $2a \bmod m$ ,  $4a \bmod m$ ,  $8a \bmod m$ ,  $\dots$
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Время работы:**  $\log_2 b$  сложений по модулю для вычисления  $(2^k \cdot a) \bmod m$  и не более  $\log_2 b$  сложений по модулю для суммирования нужных слагаемых.

# «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $a^2 \bmod m$ ,  $a^4 \bmod m$ ,  $a^8 \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю  $m$ .

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $a^2 \bmod m$ ,  $a^4 \bmod m$ ,  $a^8 \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 5$ ,  $m = 21$ .

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

$$\text{Ответ: } ((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13.$$

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $a^2 \bmod m$ ,  $a^4 \bmod m$ ,  $a^8 \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 5$ ,  $m = 21$ .

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

$$\text{Ответ: } ((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13.$$

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $a^2 \bmod m$ ,  $a^4 \bmod m$ ,  $a^8 \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 5$ ,  $m = 21$ .

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

$$\text{Ответ: } ((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13.$$

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 5$ ,  $m = 21$ .

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

**Ответ:**  $((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13$ .

- **Проверка:**  $(13^5) \bmod 21 = 371\,293 \bmod 21 = 13$ .
- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до  $(m - 1)^2$ .
- Если умножения по модулю реализовать при помощи «медленного» умножения, при вычислениях могут вновь получиться только числа от 0 до  $2 \cdot m - 2$ .

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 5$ ,  $m = 21$ .

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

**Ответ:**  $((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13$ .

- **Проверка:**  $(13^5) \bmod 21 = 371\,293 \bmod 21 = 13$ .
- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до  $(m - 1)^2$ .
- Если умножения по модулю реализовать при помощи «медленного» умножения, при вычислениях могут вновь получиться только числа от 0 до  $2 \cdot m - 2$ .

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- **Пример:**  $a = 13$ ,  $b = 5$ ,  $m = 21$ .

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

**Ответ:**  $((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13$ .

- **Проверка:**  $(13^5) \bmod 21 = 371\,293 \bmod 21 = 13$ .
- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до  $(m - 1)^2$ .
- Если умножения по модулю реализовать при помощи «медленного» умножения, при вычислениях могут вновь получиться только числа от 0 до  $2 \cdot m - 2$ .

## «Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление  $a^b \bmod m$ .

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим  $a \bmod m$ ,  $a^2 \bmod m$ ,  $a^4 \bmod m$ ,  $a^8 \bmod m$ , ...
- Рассмотрим двоичную запись  $b$  и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю  $m$ .
- **Время работы:**  $\log_2 b$  умножений по модулю для вычисления  $a^{2^k} \bmod m$  и не более  $\log_2 b$  умножений по модулю для перемножения нужных сомножителей.

## Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int mulMod (int a, int b, int m) {
5      int res = 0;
6      for ( ; b > 0; b >>= 1) {
7          if (b & 1)
8              res = (res + a) % m;
9          a = (a + a) % m;
10     }
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, m;
16     cin >> a >> b >> m;
17     cout << mulMod (a, b, m) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:

13 10 21

ВЫВОД:

4

## Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int powMod (int a, int b, int m) {
5      int res = 1 % m;
6      for ( ; b > 0; b >>= 1) {
7          if (b & 1)
8              res = (res * 1LL * a) % m;
9              a = (a * 1LL * a) % m;
10     }
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, m;
16     cin >> a >> b >> m;
17     cout << powMod (a, b, m) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:

13 5 21

ВЫВОД:

13

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{p}$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любого модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 Линейные рекуррентности
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

# Задачи

Дано число  $n$ .

- **Задача 1:** верно ли, что  $n$  простое?
- Примеры:  $n = 89$  простое,  $n = 87$  составное.
- **Задача 2:** найдите разложения числа  $n$  на простые множители.
- **Задача 3:** найдите функцию Эйлера  $\varphi(n)$ : количество чисел от 0 до  $n - 1$ , взаимно простых с  $n$ .
- Как найти значение функции Эйлера?

# Задачи

Дано число  $n$ .

- **Задача 1:** верно ли, что  $n$  простое?
- Примеры:  $n = 89$  простое,  $n = 87$  составное.
- **Задача 2:** найдите разложения числа  $n$  на простые множители.
- **Задача 3:** найдите функцию Эйлера  $\varphi(n)$ : количество чисел от 0 до  $n - 1$ , взаимно простых с  $n$ .
- Как найти значение функции Эйлера?
- $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$   
$$\varphi(n) = n \cdot \frac{p_1-1}{p_1} \cdot \frac{p_2-1}{p_2} \cdot \dots \cdot \frac{p_k-1}{p_k}$$

## Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  bool prime (int n) {
5      if (n < 2) return false;
6      for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
7          if (n % d == 0) {
8              return false;
9          }
10     }
11     return true;
12 }
13
14 int main () {
15     int k;
16     while (cin >> k) {
17         cout << prime (k) << endl;
18     }
19     return 0;
20 }
```

ВВОД:

89

87

ВЫВОД:

1

0

## Код

```

1  #include <iostream>
2  #include <utility>
3  #include <vector>
4  using namespace std;
5  vector <pair <int, int> > divisors (int n) {
6      vector <pair <int, int> > res;
7      for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
8          if (n % d == 0) {
9              res.push_back ({d, 0});
10             while (n % d == 0) {
11                 n /= d;
12                 res.back ().second += 1;
13             }
14         }
15     }
16     if (n > 1) res.push_back ({n, 1});
17     return res;
18 }
19 int main () {
20     int k;
21     while (cin >> k) {
22         auto d = divisors (k);
23         cout << k << ":" << endl;
24         for (auto p : d) cout << p.first << "^" << p.second << endl;
25     }
26     return 0;
27 }

```

Ввод:

12  
58  
81  
1  
7000

Вывод:

12:  
2^2  
3^1  
58:  
2^1  
29^1  
81:  
3^4  
1:  
7000:  
2^3  
5^3  
7^1

## Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int phi (int n) {
5      int res = n;
6      for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
7          if (n % d == 0) {
8              res = res / d * (d - 1);
9              while (n % d == 0)
10                 n /= d;
11         }
12     }
13     if (n > 1) res = res / n * (n - 1);
14     return res;
15 }
16
17 int main () {
18     int k;
19     while (cin >> k) {
20         cout << phi (k) << endl;
21     }
22     return 0;
23 }
```

ВВОД:

7  
10  
12  
9  
1

ВЫВОД:

6  
4  
4  
6  
1

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{q}$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любой модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 Линейные рекуррентности
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

# Простой модуль

Даны числа  $a$  и  $p \in \mathbb{P}$  ( $0 \leq a < p$ ).

Найдите такое  $b$ , что  $(a \cdot b) \bmod p = 1$ .

Другая запись:  $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$ .

Обозначение:  $b = a^{-1}$ .

# Простой модуль

Даны числа  $a$  и  $p \in \mathbb{P}$  ( $0 \leq a < p$ ).

Найдите такое  $b$ , что  $(a \cdot b) \bmod p = 1$ .

Другая запись:  $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$ .

Обозначение:  $b = a^{-1}$ .

- **Малая теорема Ферма:**  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

# Простой модуль

Даны числа  $a$  и  $p \in \mathbb{P}$  ( $0 \leq a < p$ ).

Найдите такое  $b$ , что  $(a \cdot b) \bmod p = 1$ .

Другая запись:  $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$ .

Обозначение:  $b = a^{-1}$ .

- **Малая теорема Ферма:**  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .
- *А значит (?),*  $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod{p}$ .

# Простой модуль

Даны числа  $a$  и  $p \in \mathbb{P}$  ( $0 \leq a < p$ ).

Найдите такое  $b$ , что  $(a \cdot b) \bmod p = 1$ .

Другая запись:  $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$ .

Обозначение:  $b = a^{-1}$ .

- **Малая теорема Ферма:**  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .
- А значит (?),  $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod{p}$ .
- Пример:  $p = 7$ .

$a^b$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	?	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	4	1	2	4	1	2	4
3	1	3	2	6	4	5	1	3	2
4	1	4	2	1	4	2	1	4	2
5	1	5	4	6	2	3	1	5	4
6	1	6	1	6	1	6	1	6	1

# Любой модуль

Даны числа  $a$  и  $n$  ( $0 \leq a < n$ ). Найдите  $b = a^{-1}$ .

# Любой модуль

Даны числа  $a$  и  $n$  ( $0 \leq a < n$ ). Найдите  $b = a^{-1}$ .

- **Теорема Эйлера:**  $\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ .

# Любой модуль

Даны числа  $a$  и  $n$  ( $0 \leq a < n$ ). Найдите  $b = a^{-1}$ .

- **Теорема Эйлера:**  $\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ .
- А значит (?),  $a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{-1} \pmod{n}$ , когда ответ существует.

# Любой модуль

Даны числа  $a$  и  $n$  ( $0 \leq a < n$ ). Найдите  $b = a^{-1}$ .

- **Теорема Эйлера:**  $\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ .
- А значит (?),  $a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{-1} \pmod{n}$ , когда ответ существует.
- Пример:  $n = 10$ .

$a^b$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	?	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	4	8	6	2	4	8	6
3	1	3	9	7	1	3	9	7	1
4	1	4	6	4	6	4	6	4	6
5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
6	1	6	6	6	6	6	6	6	6
7	1	7	9	3	1	7	9	3	1
8	1	4	2	6	8	4	2	6	8
9	1	9	1	9	1	9	1	9	1

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{n}$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любого модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 Линейные рекуррентности
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Пропустим числа 0 и 1.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

0	1	2	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	7	<u>8</u>	9
<u>10</u>	11	<u>12</u>	13	<u>14</u>	15	<u>16</u>	17	<u>18</u>	19
<u>20</u>	21	<u>22</u>	23	<u>24</u>	25	<u>26</u>	27	<u>28</u>	29
<u>30</u>	31	<u>32</u>	33	<u>34</u>	35	<u>36</u>	37	<u>38</u>	39
<u>40</u>	41	<u>42</u>	43	<u>44</u>	45	<u>46</u>	47	<u>48</u>	49
<u>50</u>	51	<u>52</u>	53	<u>54</u>	55	<u>56</u>	57	<u>58</u>	59
<u>60</u>	61	<u>62</u>	63	<u>64</u>	65	<u>66</u>	67	<u>68</u>	69
<u>70</u>	71	<u>72</u>	73	<u>74</u>	75	<u>76</u>	77	<u>78</u>	79
<u>80</u>	81	<u>82</u>	83	<u>84</u>	85	<u>86</u>	87	<u>88</u>	89
<u>90</u>	91	<u>92</u>	93	<u>94</u>	95	<u>96</u>	97	<u>98</u>	99

Вычеркнем всё, что делится на 2.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	11	<u>12</u>	13	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	17	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	23	<u>24</u>	25	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	29
<u>30</u>	31	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	35	<u>36</u>	37	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	41	<u>42</u>	43	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	47	<u>48</u>	49
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	53	<u>54</u>	55	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	59
<u>60</u>	61	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	65	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	71	<u>72</u>	73	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	77	<u>78</u>	79
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	83	<u>84</u>	85	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	89
<u>90</u>	91	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	95	<u>96</u>	97	<u>98</u>	<u>99</u>

Вычеркнем всё, что делится на 3.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>
<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>
<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>

Пропустим число 4.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>
<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>
<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>

Вычеркнем всё, что делится на 5.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>
<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>
<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>

Пропустим число 6.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>
<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>
<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>

Вычеркнем всё, что делится на 7.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>
<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>
<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>

Пропустим числа 8 и 9.

# Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до  $n$ .

<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<u>20</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
<u>30</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<u>40</u>	<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>
<u>50</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>
<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>69</u>
<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>
<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>
<u>90</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>

Числа 10 и далее можно не рассматривать.

## Код

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main () {
6      int n;
7      cin >> n;
8      vector <int> s (n);
9      for (int i = 2; i * i < n; i++)
10         if (!s[i])
11             for (int j = i * i; j < n; j += i)
12                 s[j] = 1;
13     for (int i = 2; i < n; i++)
14         if (!s[i])
15             cout << i << endl;
16     return 0;
17 }
```

ВВОД:  
30

ВЫВОД:  
2  
3  
5  
7  
11  
13  
17  
19  
23  
29

## Код

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main () {
6      int n;
7      cin >> n;
8      vector <int> d (n);
9      for (int i = 2; i * i < n; i++)
10         if (!d[i])
11             for (int j = i * i; j < n; j += i)
12                 if (!d[j])
13                     d[j] = i;
14     for (int i = 2; i < n; i++)
15         cout << i << ": " << d[i] << endl;
16     return 0;
17 }
```

ВВОД:  
16

ВЫВОД:  
2: 0  
3: 0  
4: 2  
5: 0  
6: 2  
7: 0  
8: 2  
9: 3  
10: 2  
11: 0  
12: 2  
13: 0  
14: 2  
15: 3

# Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
  - Наибольший общий делитель
  - Наименьшее общее кратное
  - Код
  - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
  - Работа с остатками по модулю
  - «Медленное» умножение
  - «Быстрое» возведение в степень
  - Код
- 3 Алгоритмы за  $\sqrt{n}$ 
  - Задачи
  - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
  - Простой модуль
  - Любого модуль
- 5 Решето Эратосфена
  - Алгоритм
  - Код
- 6 **Линейные рекуррентности**
  - Числа Фибоначчи
  - Пример
  - Пример с многочленом

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \\ F_{n-1} = F_{n-1} \end{cases}$$

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n-1} + F_{n-2} \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix}$$

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-2} \\ F_{n-3} \end{pmatrix}$$

# Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи:  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ ,  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  при  $n \geq 2$ .

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите  $F_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$$

## Пример

Рассмотрим такую последовательность:  $G_0 = 0$ ,  $G_1 = 1$ ,  $G_2 = 3$ ,  
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$  при  $n \geq 3$ .

Задача: найдите  $G_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

## Пример

Рассмотрим такую последовательность:  $G_0 = 0$ ,  $G_1 = 1$ ,  $G_2 = 3$ ,  
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$  при  $n \geq 3$ .

Задача: найдите  $G_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$$

## Пример

Рассмотрим такую последовательность:  $G_0 = 0$ ,  $G_1 = 1$ ,  $G_2 = 3$ ,  
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$  при  $n \geq 3$ .

Задача: найдите  $G_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{cases} G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3} \\ G_{n-1} = G_{n-1} \\ G_{n-2} = G_{n-2} \end{cases}$$

## Пример

Рассмотрим такую последовательность:  $G_0 = 0$ ,  $G_1 = 1$ ,  $G_2 = 3$ ,  
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$  при  $n \geq 3$ .

Задача: найдите  $G_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} G_n \\ G_{n-1} \\ G_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_{n-1} \\ G_{n-2} \\ G_{n-3} \end{pmatrix}$$

# Пример

Рассмотрим такую последовательность:  $G_0 = 0$ ,  $G_1 = 1$ ,  $G_2 = 3$ ,  
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$  при  $n \geq 3$ .

Задача: найдите  $G_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} G_n \\ G_{n-1} \\ G_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-2} \begin{pmatrix} G_2 \\ G_1 \\ G_0 \end{pmatrix}$$

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$$

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{cases} H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1 \\ H_{n-1} = H_{n-1} \end{cases}$$

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{cases} H_n &= 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1 \\ H_{n-1} &= H_{n-1} \\ 1 &= 1 \end{cases}$$

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{cases} H_n &= 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1 \\ H_{n-1} &= H_{n-1} \\ n^2 &= (n-1)^2 + 2(n-1) + 1 \\ n &= (n-1) + 1 \\ 1 &= 1 \end{cases}$$

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} H_n \\ H_{n-1} \\ n^2 \\ n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_{n-1} \\ H_{n-2} \\ (n-1)^2 \\ n-1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

## Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность:  $H_0 = 4$ ,  $H_1 = -3$ ,  
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$  при  $n \geq 2$ .

Задача: найдите  $H_n \bmod m$ , где  $n$  и  $m$  до  $10^9$ .

$$\begin{pmatrix} H_n \\ H_{n-1} \\ n^2 \\ n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_0 \\ 1^2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

# Вопросы?

# Вопросы?